

Sommaren blev ganska normal



Början av sommaren blev mycket kall. I Jämtland uppmättes en av de kallaste junimånaderna hittills. I början av juli var det ordentligt varmt, men sedan sjönk temperaturerna igen vilket gjorde att hela månaden bara blev lite varmare än normalt. Meteorologiskt sett hade sommaren anlänt till hela Sverige den 20 juli, förutom på några platser i fjällen. I och med det varma vädret i augusti kom sommaren även till dessa platser, till exempel Hemavan-Giertevarto, Blåhammaren och Sylarna, i mitten av denna månad.

Under sommaren regnade det mycket i de östra delarna av norra Norrland. Till exempel Haparanda slog rekord i nederbörd med 97 millimeter i juni. Även juli blev blött – Ulrika i Östergötland (mätningarna började 1908) och Västerhaninge i Södermanland (startår 1927) satte nya juli-rekord för månadsnederbörd. Slutet av sommaren blev torrare och större delen av landet hade fram till den 27 augusti fått mindre nederbörd än normalt under sommaren.

Sommarens temperatur

Temperaturavvikelse från den normala, sommaren 2015 (juni, juli och augusti).



Antal graders avvikelse från det normala



Sommarens nederbörd

Nederbördens avvikelse från det normala, sommaren 2015 (juni, juli och augusti).

Avvikelse i procent från det normala



KÄLLA/KARTOR: SMHI

Väderår med flera rekord

VÄRME TILL SLUT Varm och blöt sommar, kall och varm vår med bitvis mycket regn och så en extra varm höst. 2015 års väder bjöd på mycket av det vanliga men också några rekord.



TEXT OCH GRAFIK:
THOMAS MOLÉN



Vårens temperatur

Temperaturavvikelse för våren 2015 (mars, april och maj).



Antal graders avvikelse från det normala



Vårens nederbörd

Nederbördsavvikelse för våren 2015 (mars, april och maj).



Avvikelse i procent från det normala



Höstens temperatur

Temperaturavvikelse från det normala, hösten 2015 (september, oktober och november).



Antal graders avvikelse från det normala



Höstens nederbörd

Nederbördens avvikelse från det normala, hösten 2015 (september, oktober och november).

Avvikelse i procent från det normala



Varm start på våren

Våren inleddes i mars med temperaturer en bra bit över normala. April hade aprilväder och maj blev kallare än normalt. Den kalla avslutningen gjorde att våren som helhet bara blev lite varmare än normalt. Den kalla majmånaden gjorde också att sommarens start fördröjdes. I slutet av maj hade sommaren (meteoro-

logisk definition) bara kommit till de södra kusterna. I normalfallet har då hela Götaland och Svealand sommartemperaturer. Förutom att mars var väldigt varm var det också en regnig månad. Och månaden därpå fick bara södra Sverige mindre regnmängd än normalt. Framför allt norra och östra Sverige fick ett överskott av regn under perioden.

Torr och varm höst

Hela Sverige fick en höst som var varmare än normalt. I norra Norrland var det mycket varmare än normalt. På flera håll i landet hamnade denna höst på fem-i-topp-listan över den varmaste hösten hittills.

Som helhet blev hösten torrare än normalt, eftersom det var torrt under både

oktober och november i södra Norrland och östra Götaland. I vissa områden i Hälsingland och Småland föll mindre än 50 procent av den normala nederbörds-mängden.

thomas.molen@svd.se

SvD.se →

Mer väder hittar du på **SvD.se**